

CUBOLAC

BİLEŞİMİ

Clostridium septicum , CI perfringens tip A,C ve D, CI novyi TipBB toksoidleri ve CI sordelli , CI chauvoie tam kültürleriyle hazırlanan formaldehit ile inaktive edilmiş alüminyum hidrosit (1.4 mg AL/ML)'li bir aşıdır. Aşıya prezervatif olarak thiomersal katılmıştır.

Her doz hedef hayvan türlerinde aşağıda bildirilen en az antikör düzeylerini sağlayan antijenler içerir.

0.3 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum

10 IU CI. Perfringens β antitoksin /ml serum

5 IU CI. Perfringens Σ antitoksin /ml serum

2.5 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum

3.5 IU CI. Perfringens α antitoksin /ml serum

CI sordelli ile CI chauvoei'e karşı kobaylarda %100 koruma sağlar.

ENDİKASYONLAR VE HEDEF TÜRLER

Sığır , koyun ve keçileri yanıkara (CI, chauvoie), gazlı gangren (CI ,septicum) , kara hastalık-black disease (CI novyi Tip B), CI. Sordelli infeksiyonları ve enterotoksemi'lerde (CI. Perfringens Tip A,C ve D) korur. CI perfringens Tip B 'ye karşı da bağışıklık sağlar. Bu Bağışıklık Tip C(β) ve Tip D (Σ) fraksiyonlarından elde edilir.

UYGULAMA VE DOZU

Deriyaltı veya kasiçi yolla uygulanır. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Doz: Sığırlar için 5 ml, koyun ve keçiler için 2 ml.

Aşağıdaki aşılama programı tavsiye edilir;

Primer bağışıklık : iki doz aşı (6 hafta ara ile).

Yavrulama başlaması düşünülürse, gebe hayavan doğumdan 15 gün önce aşılanmalıdır. Böylelikle , normal olarak buzağının ilk 1 saatte emmeye başlaması düşünülürse, buzağı 1 haftalıkken enterotoksemiden korunması için yeterli antikoru kolostrum ile alabilir. Aşılanmamış anadan doğan yavrulara ilk doz 2 haftalıkken yapılabilirç Aşılanmış anadan doğan yavrulara 10-12 haftalık olmadan ilk doz aşıları yapılmamalıdır.

Aşılama her 6 ayda tek doz olarak tekrarlanmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et ve süt için 0 gündür.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Aşının içerdiği adjuvan enjeksiyon bölgesinde nodül oluşturabilir. Bazen ,hipersensitivite reaksiyonları oluşabilir. Böyle durumlarda gecikmeden uygun antihistaminik tedavi uygulanmalıdır.

GENEL UYARILAR

- Sadece sağlıklı hayvanlarda uygulayınız.
- Şişe açıldığında içeriğin tümünü kullanınız.
- Aseptik önlem alınız.